

사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 사용하지 말 것

- 1) 만 3세 이하의 어린이
- 2) 이 제품에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자

2. 다음 부위에는 사용하지 말 것

- 1) 눈주위, 점막 등
- 2) 습윤, 옷 등의 의한 피부염, 상처부위

3. 다음 경우에는 신중히 투여할 것(사용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람
- 2) 습윤이나 진무름이 심한 사람
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 수유부

4. 부작용

- 1) 이 제품의 사용으로 인해, 발진, 발적(종창), 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것
- 2) 수일간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킨다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.

- 3) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우는 물로 씻을 것. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 치료를 받을 것
- 4) 이 제품은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것
- 5) 사용전에 잘 흔들어 사용할 것
- 6) 환부로부터 10cm의 거리에서 뿌릴 것
- 7) 동일 부위에 연속하여 3초 이상 뿌리지 말 것
- 8) 살리실산메틸은 피부를 통하여 많은 양이 흡수될 경우 중독증상이 나타날 수 있으므로 넓은 표면에 대한 장기간의 사용은 피한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것
- 3) 온도가 40℃이상이 되는 곳에 보관하지 말 것
- 4) 오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것
- 5) 불 근처에 두지 말 것
- 6) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것
- 7) 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것
- 8) 불속에 버리지 말 것
- 9) 난로, 풍로 등 화기 부근에서 사용하지 말 것
- 10) 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것
- 11) 사용 후 잔가스가 없도록 하여 버릴 것